Table 11.27 from (2012KE01): R-matrix analysis of ^{11}B resonance states in ^{10}B + n (1990SA24) [a]

E_x (MeV)	J^π	Γ_{n_0} (MeV)	Γ_{n_1} (MeV)	Γ_{n_2} (MeV)	Γ_{n_3} (MeV)	Γ_{n_4} (MeV)	Γ_{n_5} (MeV)	Γ_{α_0} (MeV)	Γ_{α_1} (MeV)
10.6	$\frac{7}{2}^+$							0.003	0.006
11.6	$\frac{5}{2}^+$	0.004						0.296	0.100
11.8	$\frac{7}{2}^+$	1.339						0.002	0.113
11.9	$\frac{5}{2}^-$	0.001						0.080	0.090
13.1	$\frac{9}{2}^-$	0.200						0.275	0.050
13.2	$\frac{5}{2}^+$	0.020	0.033					0.194	0.116
13.7	$\frac{3}{2}^+$	0.250	0.250					0.125	0.125
13.9	$\frac{5}{2}^-$	0.125	0.500						
14.0	$\frac{11}{2}^+$	0.800						0.045	0.010
15.2	$\frac{7}{2}^+$	0.250	0.125		0.125			0.062	0.125
15.6	$\frac{5}{2}^+$	1.000	0.300	0.025	0.380			0.068	0.278
15.8	$\frac{9}{2}^-$	0.031	0.015		0.006			0.015	0.031
16.5	$\frac{7}{2}^-$	0.500	0.250	0.100	0.010	0.500			
16.9	$\frac{5}{2}^-$	0.500	0.500	0.100	0.063	0.250			
17.8	$\frac{9}{2}^-$	0.500	0.500		0.250	0.012	1.000		
17.9	$\frac{7}{2}^-$	0.500	0.250	0.125	0.250	0.500	0.250		
18.1	$\frac{9}{2}^+$	0.125				0.063	0.125		
19.5	$\frac{5}{2}^-$	0.500				0.500			

[a] Additional fit parameters are given in (1990SA24).